Alulírott .....(szülő) aláírásommal igazolom, hogy részletes tájékoztatást kaptam gyermekem orvosától a kötelező, önkéntes és ajánlott csecsemő- és gyermekkori oltásokról.

Az oltási naptárat átvettem.

Dátum: .....

aláírás

Védőoltás / Kor	Szülés	6.hét-2.hó	3.hó	4.hó	6.hó	12.hó	15hó	18hó	..	..	6 év	..	..	11é	13é
BCG															
Diphteria, Pertussis, Tetanus, Polio[1]														dTap	
Haemophilus influenzae b															
Morbilli-Rubeola-Mumps															
Hepatitis B vakcinák[2]															
Pneumococcus[3] (konjugált vakcina)															
Rotavírus[4]															
Bárányhimlő[5]															
Influenza[6]															
Meningococcus C[7]															
Meningococcus A,C,W-135,Y[8]															
Kullancs encephalitis[9]															
Hepatitis A vakcinák[10]															
HPV[11]															

Magyarázat

kötelező oltások — önkéntes-térítésmentes oltások — ajánlott oltások

Az orvosnál marad!

1. Torokgyík, tetanus és szamárköhögés, illetve fertőző gyermekbénulás és Haemophilus influenzae B típusa által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás. 11 éves korban változás történt diphteria, tetanus oltás (10 évente ezután ismétlés javasolt) előnyös dTap oltás (Boostrix használata! 2009 második felétől).

2. Hepatitis B vírus elleni oltásra születéstől van lehetőség (vírushordozó anyák gyermekeinek kötelező) HAV együtt adása esetén kombinált vakcina is alkal mazható- Twinrix 1 éves kor felett.

3. Új! Pneumococcus konjugált vakcina, Prevenar13 2 éves kor alatt ingyenes oltás. (korábban elkezdett Prevenar oltás felzárkózó oltására is.) Életkorhoz kötött oltási séma!

4. Rotavírus elleni vakcinák: Rotarix, Rotateq. Az oltást 6 hónapos korig be kell fejezni!!!

5. Bárányhimlő elleni vakcina: Varilrix, **(megváltozott oltási séma! 12 hónapos kor felett, 2 oltás minimum 4 hetes időközzel)**.

6. Influenza elleni oltások, split vakcinák: Fluarix-, Vaxigrip (Junior/Adult) 6 hónapos kor felett alkalmazható. 9 éves kor alatt első oltás alkalmával 2 oltás, 6 hét különbséggel. Teljes vírus vakcina: Fluval AB 3 éves kor felett egy oltás. Az influenza oltások ismétlése évente szükséges.

7. Meningococcus C elleni konjugált vakcinák: Meningitec, Neisvac, Menjugate 6 hetes kortól van lehetőség oltásra.

8. Új!Meningococcus A,C,W-135,Y elleni konjugált vakcina: Menveo 11 éves kortól. Kiemelkedő fontosságú külföldi utazás esetén, illetve tartós külföldi tartózkodás (kollégium) esetén serdülő korban, fiatal felnőtt korig!

9. Kullancs encephalitis elleni oltások: FSME-, Encepur (Junior/Adult). Lakóhelyük, életvitelük miatt (kirándulás) veszélyeztetettek oltása egy éves kor felett lehetséges.

10. Hepatitis A vakcinák: Havrix, Vaqta, Twinrix (Junior/Adult) alkalmazása 1 éves kor felett megengedett. Utazás esetén, vagy járványos megbetegedések esetén.

11. Humán Papilloma vírus elleni oltás kamaszkortól elsősorban nők számárára (Silgard, Cervarix).

A fenti táblázat a Magyarországon patikai forgalomban elérhető védőoltásokat tartalmazza.

HUN-PRV199-0810

Wyeth Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 78.
Tel: 06-1-453-3330, Fax: 06-1-240-4632, www.wyeth.hu
A Wyeth Kft. a Pfizer csoport tagja.